

"PENTASA® Y CORTIMENT®MMX® OFRECEN A SUS PACIENTES MEJOR ADHERENCIA AL TRATAMIENTO GRACIAS A SU ESQUEMA DE UNA SOLA TOMA AL DÍA".

"TERCER CONSENSO EUROPEO BASADO EN EVIDENCIAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA LA COLITIS ULCEROSA-ECCO⁽²⁾"

Enfermedad	Fase	Tratamiento
Colitis izquierda Leve a Moderada	Activa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ≥ 2.4 g/día de Mesalazina oral combinada con Mesalazina tópica ≥ 1 g/día [EL1]. - Declaración ECCO 11C. ✓ Budesónida MMX 9mg/día puede ser considerada en pacientes intolerantes o refractarios a la Mesalazina. [EL2] - Declaración ECCO 11D
	Remisión	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 g/día de Mesalazina oral es la dosis efectiva para mantener la enfermedad en remisión [EL1]. ✓ Una sola toma (OD) al día es el régimen de dosificación preferido [EL2]. - Declaración ECCO 12F.
Colitis Extensa Leve a Moderada	Activa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ≥ 2.4 g/día de Mesalazina oral combinada con Mesalazina tópica ≥ 1 g/día [EL1]. - Declaración ECCO 11E
	Remisión	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 g/día de Mesalazina oral es la dosis efectiva para mantener la enfermedad en remisión [EL1]. ✓ Una sola toma (OD) al día es el régimen de dosificación preferido [EL2]. - Declaración ECCO 12F.
Proctitis Leve a Moderada	Activa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1 supositorio de 1 g/día de Mesalazina es el tratamiento preferido en proctitis de leve a moderada [EL1]. - Declaración ECCO 11A
	Remisión	<ul style="list-style-type: none"> ✓ En tratamiento rectal, 3 g/semana de Mesalazina tópica en dosis divididas puede ser suficiente. [EL2] - Declaración ECCO 12F.